

System Komunikatów Sadowniczych – SKS – zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy **FRUIT AKADEMIA**. System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: **Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.**



Komunikat sadowniczy SKS XXI 2012-10-08

CHOROBY ZGORZELOWE

W okresie pozbiorczym w celu ograniczenia infekcji chorobami zgorzelowymi należy wykonać możliwie jak najszybciej po zbiorze owoców zabieg preparatem:

Topsin M 500 SC w dawce 1,5 l/ha.

Zabieg ten jest szczególnie ważny w przypadku odmian wrażliwych na choroby drewna i kory np.: Gala, Szampion, Idared.

W Holandii w tym okresie polecany jest preparat Captan w pełnej dawce.

POZBIORCZE ZWALCZANIE PARCHA JABŁONI

Aby ograniczyć pierwotne źródło infekcji, jakim są zarodniki workowe, należy wykonać jesienne opryskiwanie sadów:

4-5% (40-50 kg /ha) roztworem mocznika na początku opadania liści.

Zaleca się również rozdrobnienie opadłych liści kosiarką bijakową. Liście rozdrobnione są o wiele szybciej rozkładane przez organizmy glebowe.

NAWOŻENIE DOLISTNE

W celu zwiększenia odporności drzew (jabłonie, grusze, gatunki pestkowe) przed okresem zimowym zalecamy zastosować w okresie pomiędzy zakończeniem zbiorów owoców, a początkiem opadania liści nawóz bogaty w bor oraz cynk. Mikroskładniki te wpływają na zwiększenie mrozoodporności drzew oraz wzmacniają pąki kwiatowe. Bor jest również ważnym składnikiem pokarmowym w okresie kwitnienia i wiązania owoców. Zalecamy zastosować gotową mieszankę cynku, boru oraz azotu w postaci nawozu:

FruitAkademia po zbiorach w dawce 7,5 kg/ha dwu lub trzykrotnie.