

SKS - System Komunikatów Sadowniczych, to zbiór zaleceń agrotechnicznych przygotowywanych przez doradców z **FRUITAKADEMI** przy współpracy z **Zakładem Ochrony Roślin Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarnictwa im Szczepana Pieniążka w Skierniewicach** oraz z holenderską firmą doradczą **FruitConsult**. Program realizowany przy współudziale władz samorządowych gmin: **Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga**.

System jest finansowany przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka



Komunikat sadowniczy SKS V 2011-04-26

Ostatnie opady doprowadziły w niedzielę, w godzinach wieczornych do intensywnych i bardzo intensywnych wysiewów zarodników workowych parcha jabłoni. Z wysiewów tych rozwinęła się silna i wyjątkowo silna infekcja.

Największe zagrożenie występuje obecnie w zachodnio-centralnej części powiatu grójeckiego. W rejonie tym infekcja zaczęła rozwijać się **w poniedziałek 24 IV** około **godziny 6:00**.

We wschodniej części powiatu grójeckiego oraz w powiecie rawskim, infekcja rozpoczęła się 2-3 godziny później i została określona jako nieznacznie słabsza.

Ocenia się, że będzie to jedna z najważniejszych infekcji w obecnym sezonie, a od jej dobrego zwalczania decydować będzie powodzenie w tegorocznej walce z parchem jabłoni.

We wszystkich wymienionych rejonach gdzie doszło do silnej i bardzo silnej infekcji, należy wykonać zabieg jednym a preparatów o działaniu interwencyjnym stosując je według poniższych kryteriów:

- Działania interwencyjne należy przeprowadzić niezależnie od tego kiedy wykonany był ostatni zabieg zapobiegawczy.
- Jeśli tylko warunki temperaturowe na to pozwolą, należy użyć produktów z grupy IBE np. **Score 250 SC w dawce 0,2l/ha**. Produkty te są obecnie również polecane do zwalczania mączniaka jabłoni.
- W przypadku wahań temperaturowych można zastosować preparat **Vision 250 SC w dawce 1,5l/ha**.
- **Powinno się unikać produktów z grupy anilinopirymidyn**. Jedynie w sytuacji ciągłego utrzymywania się temperatury poniżej 10⁰C można rozważyć użycie preparatu Mythos 300SC w dawce 1,5 l/ha.
- **Pod żadnym pozorem nie stosować poinfekcyjnie produktów strobilurynowych. Takie działanie w wyjątkowo aktywny sposób promuje kształtowanie się ras odpornych patogena.**
- **Ze względu na duże ryzyko istnienia odporności, nie stosować produktów dodynowych.**
- Przypominamy, że produkty kontaktowe nie posiadają żadnych właściwości interwencyjnych.
- Ze względu na błyskawiczny przebieg obecnej infekcji, zabiegi należy wykonać bezzwłocznie, w pierwszym dogodnym do tego terminie. Należy jednocześnie zredukować nawet do 40% zwyczajowo przyjętą długości działań interwencyjnych stosowanych produktów.
- Wszystkie produkty o działaniu interwencyjnym stosować w mieszaninie z produktami kontaktowymi.

Rejon	Wysiew zarodników	Początek infekcji	Siła infekcji
Kowiesy	średni	25 IV 10:00	średnia/wysoka
Tarczyn	wysoki	25 IV 6:00	b.wysoka
Jajkowice	średni	25 IV 8:00	średnia/wysoka
Biała Rawska	średni	25 IV 8:00	średnia/wysoka
Kaleń	wysoki	25 IV 6:00	b.wysoka
Główczyn	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Trzylatków	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Wilczoruda	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Sadkowice	wysoki	25 IV 6:00	b.wysoka
Golianki	wysoki	25 IV 6:00	b.wysoka
Belsk Buży	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Łęczeszyce	wysoki	25 IV 6:00	b.wysoka
Goszczyń	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Kozietuły	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Główczyn	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Błędów	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Ignaców	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Lewiczyn	wysoki	25 IV 6:00	b.wysoka
Zalesie/Przęstawice	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Maciejowice	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Skurów	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Wólka Turowska	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Gniejewice	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Branków	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Wrociszew	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Boglewice	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Miedzechów	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka

Żyrów	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Chynów	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Budziszyn	wysoki	25 IV 6:00	b.wysoka
Nowa Wieś	wysoki	25 IV 5:00	b.wysoka
Wichradz	wysoki	25 IV 7:00	wysoka
Stara Warka	wysoki	25 IV 7:00	wysoka
Magierowa Wola	wysoki	25 IV 7:00	wysoka
Konary	wysoki	25 IV 6:00	wysoka
Linin	wysoki	25 IV 7:00	wysoka
Góra Kalwaria	wysoki	25 IV 7:00	wysoka

POZDRAWIAMY