

# INFORMACJA DO S -1

(Parch jabłoni)

**z dnia 04.04.2012**

## **Zalecenia ochrony na okres od pęknięcia pąków do fazy mysich uszek**

W celu stałego zabezpieczenia pąków przed zakażeniem przez parch jabłoni należy zapobiegawczo wykonać opryskiwanie jednym z niżej podanych środków ochrony roślin w odstępach 5-7 dni w miarę rozwoju tych pąków. **Zalecenia dotyczą sytuacji, kiedy nie stwierdza się zdecydowanych infekcji i nie są sygnalizowane terminy zakażeń.**

Zalecane środki:

Dawka na 1/ha

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| NEORAM 37,5 WG        | 2 kg         |
| NORDOX 75 WG          | 0,75-1 kg    |
| CUPROFLOW 375 SC      | 1,5-2 l      |
| FUNGURAN - OH 50 WP   | 0,75 kg      |
| FUNGURAN A PLUS 50 WP | 0,75 kg      |
| MIEDZIAN 50 WP/ 50WG  | 1,5 kg       |
| MIEDZIAN EXTRA 350 SC | 1,5 – 2,0 l  |
| MERPAN 80 WG          | 1,9 kg       |
| CAPTAN 80 WG          | 1,9 kg       |
| DELAN 700 WG          | 0,5 -0,75 kg |
| DITHANE NEO-TEC 75 WG | 3,0 - 4,5 kg |
| FOLPAN 80 WG          | 3,0 kg       |
| KAPTAN zaw. 50 WP     | 3,0 kg       |
| ANTRACOL 70 WG        | 2,0-2,25 kg  |
| POLYRAM 70 WG         | 3,0 - 4,5 kg |

### **UWAGA !**

Środki miedziowe zaleca się stosować w fazie pęknięcia pąków do fazy ukazywania się pierwszych liści - ograniczają występowanie zarazy ogniowej .

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środków ochrony roślin.***