

# INFORMACJA DO **S-16**

## **Z DNIA 04.04.2012** **o zwalczaniu kwieciaka jabłkowca**

W sadach w których w roku ubiegłym **obserwowano liczne uszkodzenia pąków kwiatowych**, należy wykonać opryskiwanie drzew w okresie nabrzmiewania lub pęknięcia pąków stosując jeden z wymienionych środków ochrony roślin. Opryskiwanie wykonać w dni słoneczne przy temp. powyżej + 12<sup>0</sup> C.

<b>ZALECANE ŚRODKI</b>	<b>DAWKA na 1 ha</b>
<b>ACTARA 25 WG</b>	<b>0,16-0,18 kg</b>
<b>CALYPSO 480 SC</b>	<b>0,15 l</b>
<b>FASTAC 100 EC</b>	<b>0,15 -0,18 l</b>
<b>KARATE ZEON 050 CS</b>	<b>0,2 l</b>

### **Zalecenia:**

Szkodliwość kwieciaka jabłkowca zależy od intensywności kwitnienia jabłoni. Jeśli pąków jest mało, żerujący chrząszcz może zniszczyć większość z nich. Natomiast w przypadku obfitego kwitnienia kwieciak jedynie przerzedza je.

Próg szkodliwości dla kwieciaka jabłkowca wynosi:  
od 5 do 10 chrząszczy strząśniętych z 35 gałęzi na płachtę entomologiczną wiosną w fazie pęknięcia pąków, w okresie bezlistnym strząsanie należy przeprowadzać w dzień słoneczny, w południe przy temperaturze powietrza 10-12 o C

***Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.***