

INFORMACJA DO **S-51**

z dnia 04.04.2012r.

KOMUNIKAT SPECJALNY! **PROGRAM ZWALCZANIA ZARAZY OGNIOWEJ**

W sadach, w których zaraza ogniowa wystąpiła w latach poprzednich oraz w sadach i szkółkach położonych w pobliżu ognisk choroby należy wykonywać opryskiwania w następujących terminach :

I termin - *okres nabrzmiewania pąków(ale jeszcze przed ich pękaniem)*

-opryskiwać jednym z preparatów miedziowych w następujących dawkach:

	<i>jabłonie</i>	<i>grusze</i>
NEORAM 37,5 WG	0,75- 2,0 kg/ha	0,75- 2,0 kg/ha
CUPROFLOW 375 SC	1,5 l/ha	2,0 l/ha
CHAMPION 50 WP	- 1,5 kg/ha	3,0 kg/ha
FUNGURAN OH 50 WP	- 1,5 kg/ha	3,0 kg/ha
MIEDZIAN 50 WP/50 WG	- 1,5 kg/ha	3,0 kg/ha
MIEDZIAN EXTRA 350 SC	- 1,5 l/ha	2,0 l/ha

II termin- *początek i pełnia kwitnienia*

-stosować preparaty i dawki jak w I terminie

III termin- *w przypadku zagrożenia zarazą ogniową w okresie wzrostu*

owoców, opryskiwania preparatami miedziowymi powinny być kontynuowane w następujących dawkach:

	<i>jabłonie</i>	<i>grusze</i>
NEORAM 37,5 WG	0,75- 2,0 kg/ha	0,75- 2,0 kg/ha
CUPROFLOW 375 SC	1,5 l/ha	2,0 l/ha
CHAMPION 50 WP	- 0,75 kg/ha	3,0 kg/ha
FUNGURAN OH 50 WP	- 0,75 kg/ha	1,5 kg/ha
MIEDZIAN 50 WP/50 WG	- 0,75 kg/ha	1,5 kg/ha
MIEDZIAN EXTRA 350 SC	- 0,75 l/ha	1,0 l/ha

Poleca się wykonanie 2-3 zabiegów w odstępach 2-3 tygodniowych **do zakończenia wzrostu owoców.** Opryskiwania przy użyciu preparatów miedziowych należy **wykonać także po gradobiciu.**

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

