

System **K**omunikatów **S**adowniczych – **SKS** –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy **FRUIT AKADEMIA**. System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: **Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.**



## **Komunikat sadowniczy SKS VII 2012-05-08**

### **ZWALCZANIE PARCHA**

W ciągu ostatniej doby występowało wyjątkowo długie zwilżenie liści co doprowadziło do kolejnych silnych wysiewów zarodników workowych. Jednak ze względu bardzo niskie temperatury w większości regionów infekcja rozwija się wyjątkowo wolno. Zabieg zapobiegawczy wykonany 6 maja lub później jest wystarczający do powstrzymania infekcji. W przypadku kiedy po 6 maja nie został wykonany zabieg zapobiegawczy należy:

- gdy temperatura w ciągu dnia wyniesie 12 C lub więcej użyć 0,2l Score,
- gdy będzie chłodniej należy użyć 1 l Mythos lub 0,3 kg Chorus.

W każdym przypadku należy dodać do zabiegu 2 kg Captanu 80 WG (lub 3kg Kaptanu 50 WP) lub 0,5 Delanu.

### **LUSTRACJE SADÓW**

W obecnym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na staranne przeprowadzenie lustracji sadów. Aktualnie zaobserwować można szkody powodowane przez mszyce, zwójki, przędziorki. Prawidłowo prowadzone i systematyczne lustracje są ważnym elementem prowadzenia racjonalnej ochrony roślin.

### **NAWOŻENIE DOLISTNE**

W okresie po kwitnieniu należy kontynuować nawożenie borem w celu poprawienia zawiązywania owoców, stosując np. Optibor w dawce 2 kg/ha ok. 10-14 dni po zakończeniu kwitnienia.

Uwaga: z preparatami zawierającymi bor nie można mieszać giberelin ani Regalisu.